綜 説

神経系におけるアミロイド研究の最近の進歩

池 田 修 一

信州大学医学部第3内科学教室

Recent Advances in the Study of Nervous System Amyloids

Shu-ichi IKEDA

Department of Medicine (Neurology),
Shinshu University School of Medicine**Key words:** amyloidosis, familial amyloid polyneuropathy, transthyretin, Alzheimer's disease, β -proteinアミロイドーシス, 家族性アミロイドポリニューロパチー, トランスサイレチン, アルツハイマー病,
 β 蛋白

はじめに

アミロイドは β -sheet構造を有する不溶性の線維蛋白が細胞外に沈着する病変である。本病変はコンゴレッド染色陽性で、これを偏光顕微鏡下で観察すると特異な黄緑色の偏光を呈する。また超微形態学的には8~10nmの枝分かれのない細線維の集合から成っている。このような形態学的特徴を示すアミロイドが種々な病態下で全身の諸臓器を障害し、多彩な臨床症状を呈するのがアミロイドーシスである。従来本疾患は基礎疾患の有無と遺伝性の有無を中心に病型分類がなされてきた。しかし最近アミロイド蛋白の化学的性状を重視した分類法がよく使われている。表1は1980年 Glenner¹⁾が提唱したアミロイドーシスの分類法である。基本的には本疾患を臓器障害の分布様式から全身性アミロイドーシスと限局性アミロイドーシスに大別し、さらに両群に含まれる疾患を臨床像ならびにアミロイド蛋白の違いにより亜型分類している。

神経系へのアミロイド沈着は末梢神経と中枢神経の両組織に起こり、それぞれの代表的な疾患が家族性アミロイドポリニューロパチーと Alzheimer 病である。近年これらの神経系を障害するアミロイドーシスでは、

アミロイド前駆蛋白の発現機構が分子レベルから解明され、疾患の病態が急速に明らかになりつつある。そこで本稿では神経系におけるアミロイド研究の最近の進歩について記載する。

I 家族性アミロイドポリニューロパチー

A 疾患概念と臨床分類

家族性アミロイドポリニューロパチー (familial amyloid polyneuropathy, 以下 FAP と略す) は末梢神経障害と自律神経障害を主徴とする遺伝性全身性アミロイドーシスである。本疾患の研究は1952年ポルトガルの医師 Andrade²⁾が、一漁村 (Povoa de Varzim) で古くから“足の病氣”と言われていた地方病をアミロイドによる特異な遺伝性多発神経炎として報告したことに始まる。その後類似な病態が数多く見出され、FAP は現在臨床像の違いにより4型に分類されている。すなわち末梢神経症状が下肢から出現するI型、手根管症候群で発症し後に多発神経炎が加わるII型、I型類似の多発神経炎に早期から重度の腎障害を合併するIII型ならびに脳神経障害が前景をなすIV型である。この中でFAPの基本病型は下肢型とも呼ばれるI型FAPであり、以下本病型を中心に述べる。

表1 アミロイドーシスの分類とアミロイド蛋白

臨床病型	アミロイド蛋白	関連蛋白
全身性アミロイドーシス		
原発性および骨髄腫に伴うアミロイドーシス	A λ , A κ	immunoglobulin
続発性アミロイドーシス	AA	SAA
遺伝性アミロイドーシス		
家族性アミロイドポリニューロパチー (FAP)		
type I	transthyretin variant	transthyretin
type II	transthyretin variant	transthyretin
type III	apolipoprotein AI variant	apolipoprotein AI
type IV	gelsolin variant	gelsolin
家族性アミロイド心筋症	transthyretin variant	transthyretin
家族性地中海熱	AA	SAA
老人性アミロイドーシス	transthyretin	transthyretin
透析アミロイドーシス	β_2 -microglobulin	β_2 -microglobulin
限局性アミロイドーシス		
内分泌性アミロイドーシス		
甲状腺腫瘍	calcitonin	procalcitonin
膵ランゲルハンス島アミロイド	islet-amyloid-polypeptide (amylin)	calcitonin-gene-related polypeptide
心房アミロイドーシス	human atrial natriuretic peptide	
脳アミロイドーシス		
Alzheimer 病	β -protein	β -amyloid precursor protein
遺伝性脳出血		
Dutch type	β -protein	β -amyloid precursor protein
Icelandic type	cystatin C variant	cystatin C
海綿状脳症(CJD, GSS 他)	prion (PrP27-30)	PrP33-35 ^{sc}
皮膚アミロイドーシス	keratin	

CJD: Creutzfeldt-Jakob Disease, GSS: Gerstmann-Sträussler-Scheinker Disease

図1 FAPの地理的分布
 我国におけるI型FAP家系の報告地区を示す。

また本稿では特別断わらない限りFAPはI型FAPを指す。

B 臨床像

FAPはポルトガル²⁾, 日本³⁾, スウェーデン⁵⁾などに地理的片寄りをもって多発し, また我国では熊本県荒尾市³⁾と長野県北部地方⁴⁾に集積地がある。このため本症は長年地域特異性を有する疾患であるとみなされてきた。しかし近年診断法の進歩に伴い世界的には異なった民族から, また国内では全国各地からFAP家系が報告されており(図1), 本症は従来考えられていたほどまれな疾患ではないといえる。

FAPは常染色体優性遺伝を示し, 発病年齢は30代前半にピークを持つ。しかし50歳以後に発病する高齢発症者も少なくなく, これらの患者では自律神経症状が軽微で進行が遅い傾向にある。臨床症状の中核をな

表2 遺伝性アミロイドーシスにおける変異 transthyretin

I. FAP beginning in the lower limbs							
部位	アミノ酸変異	報告者	発表年	部位	アミノ酸変異	報告者	発表年
30	Val → Met	Tawara et al	1983	47	Gly → Arg	Murakami et al	1992
	Val → Ala	Skare et al	1990	49	Thr → Ala	Almeida et al	1990
	Val → Leu	Nakazato et al	1992	50	Ser → Arg	Ueno et al	1990
33	Phe → Ile	Nakazato et al	1984	55	Leu → Pro	Jacobson et al	1992
	Phe → Leu	Ii et al	1991	77	Ser → Tyr	Wallace et al	1988
36	Ala → Pro	Jones et al	1991	90	His → Asn	Skare et al	1990
42	Glu → Gly	Ueno et al	1990	114	Tyr → Cys	Ueno et al	1990
II. FAP beginning in the upper limbs associated with carpal tunnel syndrome							
58	Leu → His	Nichols et al	1989	70	Lys → Asn	Izumoto et al	1992
	Leu → Arg	Saeki et al	1991	84	Ile → Ser	Dwulet et al	1986
60	Thr → Ala	Wallace et al	1986		Ile → Asn	Skare et al	1990
64	Phe → Leu	Ii et al	1991				
III. Familial cardiac amyloidosis (neuropathy is not a prominent feature)							
45	Ala → Thr	Saraiva et al	1992	68	Ile → Leu	Almeida et al	1991
50	Ser → Ile	Nishi et al	1992	111	Leu → Met	Nordlie et al	1988
				122	Val → Ile	Gorevic et al	1989

す多発神経炎は感覚障害が優位で、下腿のしびれ・疼痛などの異常感覚で始まる。また病初期には温度覚と痛覚が選択的に障害される解離性感覚障害を示す。運動麻痺と筋萎縮は初発症状より数年遅れて出現し、またこれらの末梢神経症状に起立性低血圧、消化管運動障害、陰萎、排尿障害などの種々な自律神経障害が加わる。この中で数日の周期で繰り返される便秘と下痢、突然出現する強い嘔気・嘔吐発作はFAPに特徴的である。

身体所見では全身のやせ、巨舌、甲状腺腫が比較的多く観察され、また心臓・腎臓が高頻度に障害される。特に前者では刺激伝導系の障害が多いが、心アミロイドによる心不全が主体をなす家系も知られている⁹⁾。経過は進行性で、発病後10年前後で悪液質に多臓器不全が加わり死亡する。

C 病理所見

末梢神経系では脊髄神経根を除くすべての領域でアミロイド沈着が観察される。特に神経内膜では斑状に沈着したアミロイドの周囲に浮腫性変化が見られ、この部位を中心に神経線維の変性脱落が認められる⁷⁾ (図2)。自律神経系では交感神経ならびに副交感神経の両者に著しいアミロイド沈着が見られ⁹⁾、高度なアミロイド沈着を来した神経節は肉眼的に腫大している⁹⁾。また消化管自律神経系では病初期から外来性支配神経が著しく障害されるのに対し¹⁰⁾、内因性の壁在

神経は進行期に到ってもほぼ正常に保たれている¹¹⁾。したがってFAP患者の消化管は外来性神経と内在性神経の不均衡な支配状態であると推測され、このことが本疾患で見られる特異な消化管症状の重要な成因であろうと考えられる。一方、神経系以外の臓器へのアミロイド沈着は他の全身性アミロイドーシスと同様であるが、肝臓・脾臓へのアミロイド沈着は一般に軽度である。

D アミロイド蛋白と遺伝子異常

アミロイドーシスの成因解明の第一段階は組織に沈着した異常物質アミロイドを取り出し、その化学的性状を明らかにすることである。1983年Tawaraら¹²⁾はFAP患者の腎臓から分離したアミロイド線維蛋白の全アミノ酸配列を決定し、N末端から30番目のvalineがmethionineに置換した(30Val → Metと略す)変異transthyretin(以前はprealbuminとも呼ばれていた)が本疾患のアミロイド構成蛋白であることを報告した。これに続いてNakazatoら¹³⁾はこの変異transthyretinがアミロイド前駆蛋白として本症患者の血流中に存在することを見出し、また同時にFAP患者の血清中にある本蛋白をradioimmunoassay法¹⁴⁾で定量的に測定できる方法を確立した。

これらのアミロイド蛋白の検索結果から、FAPの成因は血中にアミロイド前駆蛋白として存在する変異transthyretinの産生機構と密接に関連しているであ

ろうと考えられ、本蛋白の発現を規定している transthyretin 遺伝子の解析¹⁵⁻¹⁹⁾が進められた。そして次のことが明らかにされた。i) ヒト transthyretin 遺伝子は7kb 大で4個の exon から成り、第18染色体上に存在する、ii) FAP の変異 transthyretin で見られる 30Val → Met に対応して exon2 の codon30 が GTG から ATG に変化している、iii) この変化した塩基配列に特異的に作用する制限酵素を用いて分析することにより FAP の簡便な DNA 診断が実施できる。特に DNA 診断法については、近年開発された polymerase chain reaction を用いることにより多数例に対し本法を容易に施行することが可能となった²⁰⁾。その結果 transthyretin 遺伝子の codon30 の guanine (G) から adenine (A) への one point mutation は民族を越えて FAP 患者の発病と完全に連鎖していることが確認され²¹⁾ (図3 a)、また検索された大部分の患者の本遺伝子の異常はヘテロ接合体であった²²⁾。さらにこの transthyretin 遺伝子の異常が FAP の発症に直接結びつく病因であることは transgenic mouse の作成により実験的にも証明された。すなわち Wakasugi ら²³⁾、Yi ら²⁴⁾はヒトの変異 transthyretin 遺伝子の全長をマウスの methallothionein-I 遺伝子の promoter 領域とともに C57BL/6 マウスの受精卵に導入した。これらのマウスは出生時から血清中にヒトの変異 transthyretin を1~5mg/dl の濃度で有しており (これは FAP 患者の血清中の変異 transthyretin 濃度の約10~50%に相当する)、生後6カ月前後から消化管を中心にアミロイド沈着が出現した。そして12ヶ月以後では心臓、腎臓、消化管へのアミロイド沈着が全ての transgenic mouse に起こることが証明された。ただしこれらの transgenic mice では末梢神経系へのアミロイド沈着は起こっておらず、さらに改良を重ねてヒトの FAP により類似した形の transgenic mouse の出現が待たれる。

以上の記載は最も頻度が高い I 型 (30Val → Met-transthyretin 型) FAP についてである。同様に他の病型の遺伝性アミロイドーシスについてもアミロイド蛋白の解析が進められ、III 型 FAP²⁵⁾ と IV 型 FAP²⁶⁾ を除くと本疾患群のアミロイド蛋白は transthyretin 由来であることが明らかにされた。現在アミロイド蛋白となりうる変異 transthyretin は26種類が同定されており、これらをおもな臨床像と対比して表2に列挙したが、30Val → Met 以外の変異 transthyretin はいずれも単一家系からの報告である。ところで trans-

thyretin は肝臓で合成される血清蛋白であり、127アミノ酸残基から成るモノマーが重合して4量体を形成し²⁷⁾、甲状腺ホルモンやビタミンAの運搬を担っている。本蛋白にはβ-sheet構造を有する部位が8ヶ所あり²⁸⁾、一アミノ酸置換が蛋白の性質を変化させてアミロイド惹起性のペプチドを造り出すと考えられている。しかしその詳細な機序はまったく不明であり、この点は今後 transthyretin の異なる部位におけるアミノ酸変異と遺伝性アミロイドーシスの多様な臨床表現型との関連を含めて検索を要するところである。一方、臨床的には類似な病像を呈しているも患者の transthyretin のアミノ酸変異が異なる場合があることは重要な事項である²⁹⁾ (図3 b)。したがって最近では FAP を代表とする遺伝性アミロイドーシスの確定診断に際しては、従来の臨床分類名に加えてアミノ酸異常を含めたアミロイド蛋白の名前が併記される傾向にある。

E FAP の重症度と血清変異 transthyretin 濃度との関連

FAP はアミロイド蛋白の化学的分析を契機に疾患の成因が DNA レベルまで解明され、本症は現在 transthyretin 遺伝子の異常に基づく分子病であるとみなされている。しかし30Val → Met 変異 transthyretin をアミロイド前駆蛋白とする I 型 FAP では、初発年齢、進行度、臓器障害の発現様式などが家系間または同一家系内でも個々の患者において大きく異なることが知られている⁶⁾。この現象を transthyretin 遺伝子の one point mutation との関連で説明するとすれば、患者血清中のアミロイド前駆蛋白 (変異 transthyretin) 濃度が一つの要因として問題となる。先に述べたごとく FAP 患者の transthyretin 遺伝子の異常は大部分がヘテロ接合体であるため、患者血清中には正常と変異 transthyretin がほぼ同じ濃度で存在している (血清中の全 transthyretin 濃度: 22.4 ± 6.6mg/dl, 変異 transthyretin 濃度: 9.18 ± 2.69mg/dl)²²⁾。この後者の変異 transthyretin 濃度と FAP 患者の発症年齢とを対比して検討すると、30歳前後の発症で進行の早い患者と50歳以後の高齢発症で進行がゆっくりな患者との間には本蛋白濃度に有意な差がなかった³⁰⁾。また変異 transthyretin 遺伝子を持ちながら70歳代・80歳代に到っても未発症の健常者がいる。さらには最近 transthyretin 遺伝子の異常がホモ接合体を示すまれな患者が自験例4名³¹⁾³²⁾を含めて13例³³⁾見出されている (図4)。これらの患者の血清中には変異 transthyretin が通常のヘテロ接合体例の約2倍量 (自験例

図2 FAPの末梢神経病理所見

- a : コンゴレッド染色偏光顕微鏡観察では神経内膜に斑状のアミロイド沈着が見られる。
- b : エポキシ包埋トルイジンブルー染色標本ではアミロイド沈着部を中心に有髄神経線維の脱落が見られる。(Bars=100 μ m)

図3 FAPのDNA診断所見

- a : I型FAP (30Val → Met-transthyretin型) のDNA診断所見。

本病型では transthyretin 遺伝子の codon 30 の G が A へ置換しており、その結果新たに制限酵素 Nsi I の作用部位 (ATGCA) が生じる。PCR を用いて transthyretin 遺伝子の exon 2 (368bp) を増幅し Nsi I で消化すると、この遺伝子変異を有する例では本酵素で DNA が切断され異常 DNA 分画が出現する。1 はポルトガル人を先祖とするアルゼンチンの I 型 FAP 患者、2 は日本人の I 型 FAP 患者、3 は対照人である。本症患者では人種の違いにも係わらず同一の遺伝子変異が見られる。

- b : 異なる病型の FAP の DNA 診断所見。

1 は対照例、2 は 30Val → Met-transthyretin 型 FAP 患者、3 は 30Val → Leu-transthyretin 型 FAP 患者である。Lane 2 と 3 の患者の臨床像は非常に類似しているが、transthyretin のアミノ酸変異は異っている。前者では制限酵素 Nsi I の作用部位があり、後者では G から C への置換に対応して Cfr13 I の作用部位が生じるため、制限酵素解析により両者の塩基配列の違いを区別することができる。

図4 変異遺伝子がホモ接合体を示した30Val → MetTTR型FAP患者のDNA解析所見

金沢市在住のFAP家系である³¹⁾。発端者を含む同胞3名がホモ接合体の変異 transthyretin 遺伝子 (Nsi I 消化後正常のDNA分画は残らず全て異常DNA分画)を有しているが、発端者の59歳の妹(⊗)は無症状である。また発端者の34歳になる長男(⊠)はヘテロ接合体の異常を示しているが、この例も診察した時点では臨床症状は見られなかった。

図5 Alzheimer病の病理所見

aは鍍銀染色による神経原線維変化、bは同一染色による老人斑である。またcはコンゴアレッド染色偏光顕微鏡観察による大脳くも膜下腔血管のCAA所見である。(Bars=50 μ m)

図6 Alzheimer病の β 蛋白陽性の老人斑とCAA

β 蛋白に対する単クローン抗体を用いた免疫組織学的染色では老人斑とCAAの両病変が特異的に染色される。また高度なアミロイド沈着を来した血管の周囲には本病変と連続性を有する老人斑様の病変が観察される(矢印頭)。(Bar=100 μ m)

では16.25~32.17mg/dl)ある³¹⁾³²⁾にもかかわらず、臨床的にはいずれの患者も高齢発症で、また50歳を越えても発症していない例が3名ある。従来優性遺伝疾患においてはホモ接合体例は早期発症で進行が早い重篤な臨床経過を示すと言われている。しかし30Val→Met-transferrin型FAPにおいてはむしろ逆の傾向が伺われ、この事実はFAPの病理発生機序を考える上である重要な示唆を与えている。すなわち血流中の変異transferrinの存在はFAPの発症に関与する一つの重要な要因ではあるが、このアミロイド前駆蛋白の量が本症の発症年齢を含めた臨床像の重篤さを規定する因子ではないということである。おそらく他にアミロイド沈着を促進または抑制する因子があるものと推測される。

F 診断と治療

FAPが疑われたら胃、直腸、皮膚、腓腹神経等の組織生検を行いアミロイド沈着を確認する。大部分の患者は30Val→Met-transferrin型であり、通常は白血球から得たgenomic DNAを用いてexon 2の制限酵素解析²⁰⁾を行うか、またはradioimmunoassay法¹⁹⁾で血清中の変異transferrinを検出することにより診断を下すことができる。一方、組織アミロイドが抗transferrin抗体陽性でありながら上記のDNAまたは血清診断法が陰性的場合には、30Val→Met以外の変異を疑いtransferrin遺伝子の全てのexonの塩基配列の解析を行うか、または血清transferrinのアミノ酸配列を全長にわたって分析する必要がある。

治療法の主体は対症療法であり、起立性低血圧・消化管運動障害などの自律神経障害に対してはnor-adrenalinの前駆物質であるL-DOPS(ドロキシドパ)の経口投与³⁴⁾が有効である。また心伝導障害には人工ペースメーカーの植え込みが必要である。一方、最近スウェーデンを中心に欧米では変異transferrinの産生部位である肝臓を移植により交換し根治療法を目指そうとする試みがなされている³⁵⁾³⁶⁾。現時点では31例が本療法を受けており、最長例は手術後3年を経過している。肝臓移植前後の血清中の変異transferrin濃度は2例で検討されており、両例とも手術直後から血清中の本蛋白濃度はほとんどゼロを示している³⁵⁾。また臨床的にはいずれの患者も術後比較的早期から嘔気・下痢などの消化管症状の改善が見られ、四肢の多発神経炎症状は進行が停止しているようである(Dr. Holmgren, personal communication)。しか

し大部分の患者は手術後の期間が短く、本治療法の長期的効果を評価するまでには到っていない。おそらく血流中からアミロイド前駆蛋白が消失すれば体内におけるアミロイド沈着は停止すると考えられるが、すでに沈着しているアミロイドが肝臓移植によりどのような影響を受けるのかについては今後の検索を待たねばならない。

II Alzheimer病と脳アミロイド

A 脳アミロイド研究の歴史的背景

脳組織におけるアミロイド沈着はFAPとは異なり脳に限局するアミロイドーシスである。脳へのアミロイド沈着が特定の疾患との関連で注目され出したのは、1972年Gudmundssonら³⁷⁾がアイスランド型遺伝性脳出血(Icelandic type hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis)の原因が脳血管壁へのアミロイド沈着によると記載したことに始まる。この脳血管壁へのアミロイド沈着は脳の髄膜血管と皮質血管を中心に発生し、一般に脳アミロイドアンギオパチー(cerebral amyloid angiopathy, 以下CAAと略す)と呼ばれている。本病態は当初独立した一疾患と考えられたが、その後種々な変性疾患³⁸⁾でも見られることが判明した。特にCAAがAlzheimer病の脳において普遍的に観察され、また以下に述べるように本病変を手懸かりとしてAlzheimer病の発現機序が解明されるに到り、脳アミロイド研究は一躍脚光を浴びるようになった。

B Alzheimer病におけるアミロイドβ蛋白の発見

Alzheimer病は老年期痴呆の代表的な疾患であり、本症の脳は神経細胞の高度な脱落と神経原線維変化ならびに老人斑の出現で特徴づけられる(図5 a, b)。このため従来からAlzheimer病の原因究明はこれら二つの異常構造物の化学的性状を解明し、また同時に両病変の脳内での発現機序を明らかにする研究が進められてきた。組織学的には神経原線維変化は神経細胞の胞体内に出現し、これは超微形態学的には2本の細線維が約80nmの間隔で規則的にねじれた形(paired helical filaments, 以下PHFsと略す)³⁹⁾を示す。一方、老人斑は細胞外に観察され、典型的な本病変は中心にアミロイド細線維の沈着を有し、これを変性神経突起が取り囲んでいる。しかしこれらのPHFsおよび老人斑アミロイドはいずれも難溶性であり、またAlzheimer病の剖検脳では神経原線維変化と老人斑が無数に存在するため、PHFsと老人斑アミロイドのいず

れか一方を純粋な形で脳から取り出すことは長い間手技的に困難であった。

これに対し Glenner ら⁴⁰⁾は大部分の Alzheimer 病患者が CAA (図 5 c) を伴っていることを見出し、本病変と老人斑は同一のアミロイド蛋白から成る脳病変であると仮定した。そして本症患者の脳からくも膜を剝離してこの中に含まれる血管からアミロイド細線維を分離・精製し、これを塩酸グアニジンで可溶化して分子量 4.2kDa のポリペプチドを得ることに成功した。こうして N 末端から 28 個のアミノ酸配列が明らかにされたアミロイド蛋白は既知のいかなる蛋白とも異なっていたため、1984 年 β 蛋白⁴¹⁾と命名された。翌年 Masters ら⁴²⁾により老人斑アミロイドのアミノ酸配列が直接決定され、本蛋白 (A 4 蛋白) は N 末端から 11 番目の glutamine が glutamic acid に置換されている以外は β 蛋白と同一であった。さらに抗 β 蛋白抗体を用いた免疫組織学的検索からも、Alzheimer 病の老人斑と脳血管壁に沈着するアミロイドはともに β 蛋白から構成されていることが確認された⁴³⁾⁴⁴⁾ (図 6)。

C 老人斑の形成過程と β 蛋白の出現

老人斑の形成機序に関しては Wisniewski と Terry⁴⁵⁾の報告以来神経突起の変性が一次的要因として重視され、アミロイド沈着は本病変に続発する変化であるとみなされてきた。しかし近年抗 β 蛋白抗体を用いた免疫組織学的染色が行われるようになり、Alzheimer 病の脳には既知の老人斑とは異なる形の斑状病変の存在が明らかとなった。本病変は境界不鮮明で淡い顆粒状の外見を呈する β 蛋白の沈着病変で、“diffuse plaque”⁴⁶⁾と呼ばれている。またこの病変内にはアミロイド沈着または変性神経突起のいずれも見出すことができないため、従来の原始老人斑に先行するところのきわめて早期の段階の老人斑と考えられ、“preamyloid plaque”⁴⁷⁾または early plaque⁴⁸⁾ (早期老人斑)とも呼ばれている (図 7 a)。しかし Alzheimer 病の剖検脳のみを検索では老人斑を含めた本疾患脳の経時的病理形態変化を明らかにすることはできない。

一方、 β 蛋白前駆体の発現を規定する遺伝子は第 21 染色体上に存在し⁴⁹⁾、本遺伝子が trisomy である Down 症候群では β 蛋白の産生が正常の 1.5 倍に増加している。その結果、本症候群患者では比較的若年から脳内に Alzheimer 病変化が出現することが知られている⁵⁰⁾。実際成人 Down 症候群の脳を年代別に検

索⁵¹⁾すると、30 歳代の患者では早期老人斑のみが大脳皮質に多数認められ (図 7 a)、40 歳代の患者では本病変に加えて変性神経突起を伴う原始老人斑が少数観察される。さらに 50 歳代以後の患者では明瞭なアミロイド沈着と変性神経突起を有する典型的な老人斑が見られ (図 7 b)、その数は加齢とともに増加する。また 40 歳代以後の患者では CAA ならびに神経原線維変化が高頻度に見られる。したがってこれらの一連の所見から、Down 症候群の Alzheimer 病様変化の中で最も早期に出現する病変は早期老人斑の形で β 蛋白が脳実質へ沈着することであると結論される。なお神経原線維変化を構成する PHFs の完全なアミノ酸配列は未だ得られていないが、tau 蛋白⁶²⁾が C 末端に近い部分の構成成分であることが見出されている。この tau は神経細胞の cytoskeletal protein の一種である microtubule に関連した蛋白⁶³⁾であり、先のアミロイドを構成する β 蛋白とは化学的性状がまったく違う。また神経原線維変化は Alzheimer 病以外の変性疾患の脳⁶⁴⁾でも観察されるため、老人斑に比して疾患特異性が低い病変であると考えられている。現在考えられている Alzheimer 病の経時的発生過程を図 8 に模式化する。

D β 蛋白前駆体の構造とその体内分布

β 蛋白の脳への沈着が Alzheimer 病の trigger となる病的変化であるならば、 β 蛋白の生成過程を解明することが本疾患の病因解明の中で重要な位置を占める。1987 年 Kang ら⁴⁹⁾は脳の cDNA library の検索から、 β 蛋白は 695 個のアミノ酸から成る β 蛋白前駆体 (β -amyloid precursor protein, 以下 β -APP と略す) の分解により生じることを報告した。その後 β -APP の isoform が相次いでクローニングされ、現在本蛋白は基本的にはアミノ酸数が 695⁴⁹⁾、751⁶⁵⁾⁶⁶⁾、770⁶⁷⁾ の 3 種類の subtype があり、これらの β -APP は同一の遺伝子から alternative splicing により生じると考えられている。 β -APP695 の基本的な構造は細胞外・膜貫通部・細胞内の 3 ドメインから成り、アミロイド惹起性のペプチドである β 蛋白 (約 43 アミノ酸残基から成る) は膜貫通部を含む β -APP の C 末端に近い部位を占めている (図 9)。また β -APP751 および 770 は β -APP695 の N 末端に近い処にそれぞれ 56 個と 56+19 個のアミノ酸配列が挿入したものである (図 9)。この両者に共通な 56 アミノ酸挿入配列は trypsin の活性抑制作用を持つ Kunitz 型 serine protease inhibitor (KPI と略す) と強い相同性があり⁶⁵⁾⁻⁶⁷⁾、一般に KPI

図7 成人 Down 症候群の β 蛋白陽性の老人斑病変
 a : 38歳例では境界不鮮明な淡い斑状病変（早期老人斑）が多数観察される。b : 62歳例では明瞭なアミロイド核を有する老人斑が数多く見られる。(Bars=100 μ m)

図8 Alzheimer 病変の経時的形態変化
 A : 初期変化。 β 蛋白の沈着から成る早期老人斑のみが出現するが、本病変に接する神経細胞には有意な変化は見られない。B : 進行期： β 蛋白の沈着量は増加し、脳血管壁ならびに老人斑の中心部には明らかなアミロイド沈着が観察される。またこの時期になると老人斑周囲の神経突起は変性し、神経細胞内には tau 蛋白を含む神経原線維変化が出現する。C : 終末時：脳内へは典型的な老人斑（中心部のアミロイド沈着とそれを取り囲む変性神経突起の存在）が出現し、多くの神経細胞は変性消失し神経原線維変化が残る。

図9 β -APP の模式図
 本蛋白の基本構造を示す。 β 蛋白は細胞外ドメインと膜貫通部ドメインにまたがる形で位置し(■), また * で示す家族性 Alzheimer 病の β -APP 遺伝子の変異 (codon717における Val $\rightarrow$ Ile, Val $\rightarrow$ Phe, Val $\rightarrow$ Gly 変異ならびに codons670/671 の Lys/Met $\rightarrow$ Asn/Leu 変異) はいずれも β 蛋白の近傍に存在する。略語: PN-II: Protease Nexin-II, FAD: Familal Alzheimer's Disease.

図10 非痴呆患者の脳脊髄液中で見られる β -APP 免疫反応蛋白

Heparin-agarose affinity medium に結合する蛋白を脳脊髄液中から抽出し、 β -APP の異なる部位に対する抗体を用いて immunoblotting により観察した結果である。Lane 1, 2: 細胞外ドメインに対する抗体, 3: KPI 部分に対する抗体, 4: KPI 以外の19アミノ酸配列に対する抗体, 5, 6: β 蛋白に対する抗体, 7: 非免疫血清。分子量93-123kDa に至る β -APP 関連蛋白が検出されている。この中で分子量112-123kDa の蛋白は KPI ドメインを含む抗体に反応しており、 β -APP751または770由来と考えられる。一方、分子量93-97kDa の蛋白は上記の抗体には反応せず β -APP695に起因する蛋白と思われる。 β 蛋白に対する免疫反応性は前者の蛋白のみが有している。本所見は Allsop 博士の提供であり、詳細は文献54を参照されたい。

図11 β -APP の代謝経路の模式図
図の説明は本文中を参照されたい。

図12 早期老人斑病変の形態所見

38歳のダウン症候群例で見られた本病変の多くは中心に神経細胞体を有している (矢印頭)。
Methenamine-silver 染色 (Bar=20 μ m)

ドメインと呼ばれている。また残りの19アミノ酸挿入配列は白血球の細胞表面抗原であるOX-2に類似していることが確認されている。

β -APPのmRNAはヒトの体内では脳、腎臓、心臓、骨格筋の順で多く発現しており、特に脳では神経細胞で最も多く発現している⁶⁸⁾。またsubtype別では β -APP695は脳の神経細胞で特異的に発現しているのに対し、脳以外の全身臓器ではKPIドメインを含む β -APP751/770の発現が圧倒的に多い。さらに近年血小板の α 顆粒にKPIドメインを有する β -APPが含まれており、本蛋白は何らかの刺激により血小板から血流中へ放出されることが明らかにされている⁶⁹⁾。一方、 β -APPの生理作用について不明な点が多いが、KPIドメインを有する β -APPの細胞外ドメインには血液凝固因子のfactor XIaを強く阻害するprotease nexin IIの作用⁶⁰⁾⁶¹⁾があるとされおり、この生理作用は β -APP751と770が血小板の α 顆粒に多量に含まれていることと関連づけることができる。

E β -APPの代謝と β 蛋白の産生

β -APPはどのような代謝過程を経てアミロイド蛋白となるのであろうか。この点に関しては近年神経細胞の培養液⁶²⁾、ヒトの血清⁶³⁾ならびに脳脊髄液内⁶²⁾⁶⁴⁾において β -APP関連蛋白がimmunoblotting法で同定されるようになり(図10)、本蛋白の代謝経路の一端が解明されつつある。これらの β -APP関連蛋白は分子量約90から130kDaで、一部の蛋白分画ではN末端の部分アミノ酸配列が明らかにされている。いずれの蛋白も図9に示すごとく β -APPの細胞外ドメインに相当しており、 β 蛋白の大部分を含む β -APPのC末端部分は含まれていないと想定されている。この β 蛋白の内部(本蛋白のN末端より16番目のlysineと17番目のleucineの間)で切断され細胞外へ放出される蛋白は分泌型(secretory form) β -APPと呼ばれており、この代謝経路は“secretory pathway”⁶⁵⁾とされている。一方、この代謝経路とは別に β -APPの代謝・分解に関与している系がlysosomeにあることが見出されており、本代謝経路は“endosomal-lysosomal pathway”⁶⁶⁾⁻⁶⁸⁾と呼ばれている。この両代謝経路の相互関連は不明であるが、健常状態ではおもにsecretory pathwayが働いてGolgiで産生された β -APPは細胞膜に到達するまでの間に代謝・分解され、 β 蛋白のN末端断片を含む分泌型 β -APPに相当する部分は細胞外へ放出される。また残りの β -APPのC末端断片はreinternalizationによりlysosomeに取り込ま

れさらに別な代謝を受ける。その結果、本代謝経路ではアミロイド惹起性を示すfull-lengthの β 蛋白は産生されない。これに対し病的状態ではsecretory pathwayに異常を来し、 β 蛋白が内部で切断されない形で β -APPの代謝・分解が起こるため、アミロイドを造るのに十分な長さの β 蛋白ペプチドが生成されると考えられている⁶⁷⁾⁶⁸⁾。このように想定されている β -APPの代謝様式を図11に模式的に示す。

β -APPの異常代謝が起こることが予測される病態としてはDown症候群と家族性Alzheimer病が挙げられる。Down症候群では β -APPの発現を規定する遺伝子がtrisomyであることより本蛋白の過剰産生が起こり、正常な代謝経路に乗れない余剰な β -APPが異常な代謝・分解を受ける可能性がある。また最近一部の家族性Alzheimer病では β -APP遺伝子の変異が数種類⁶⁹⁾⁷⁰⁾見出されており、これらはいずれも β 蛋白の近傍に位置する β -APPの一アミノ酸置換を引き起こす(図9)。その結果このアミノ酸変異は β -APPが β 蛋白の内部で切断される過程に影響を及ぼし、正常の代謝経路では生じない β 蛋白が造り出されると考えることができる⁷¹⁾。しかし一般のAlzheimer病では β -APPの過剰産生またはアミノ酸変異のいずれも見出されていない。おそらく加齢に伴い未知の複数の要因が β -APPの代謝過程に変化を生じさせ、アミロイド形成に到る β 蛋白が産生されるのであろうと推測される。

F β 蛋白アミロイドの沈着と神経細胞変性(アルツハイマー病の病理発生)

以上述べてきたようにAlzheimer病の病理発生は種々な原因で β -APPから β 蛋白が産生され、本蛋白から成るアミロイドが脳実質へ老人斑の形で沈着することにより神経細胞変性が起ると要約することができる。この β 蛋白の起源に関しては従来から血清由来(serum origin)⁷²⁾と神経細胞由来(neuronal origin)⁷³⁾の二つの仮説があるが、最近では後者が有力視されている。すなわち前者の根拠となった脳血管アミロイドと連続性を有する老人斑アミロイド(図6)はむしろまれな病変であり、多くの早期老人斑病変は血管とは一定の関連を有していないと考えられる。一方、早期老人斑を連続切片を用いて検索すると多くの本病変内には神経細胞体が観察され⁷⁴⁾(図12)、また微量なアミロイドは神経細胞を取り巻くような形で沈着している。この形態学所見に加えて、 β -APPのmRNAが神経細胞でより特異的に発現している⁶⁸⁾こと

も老人斑を形成する β 蛋白が神経細胞由来であることの根拠となっている。 β 蛋白が神経細胞外で沈着を開始する部位としては細胞体近傍のシナプス領域⁷⁵⁾が重視されている。この部位で発現した β 蛋白は単独で神経毒性を発揮する⁷⁶⁾可能性が指摘されており、さらにアミロイド化した β 蛋白は周辺の組織に機械的障害を加え、神経細胞障害を助長すると考えられている。

カリフォルニア大学サンディエゴ校のGlenn博士がAlzheimer病の“アミロイド原因説”を提唱して以来約10年の歳月が流れようとしている。この間にAlzheimer病の成因解明は急速に進展したが、まだ治療法について言及するまでには至っていない。Alzheimer病の成因は脳の老化現象と密接に関連している。近年急速に高齢化社会を迎える中で“老いてもボケたくはない”とは誰しもがひそかに願うことである。多くの人が老後を快適に過ごすためにもAlzheimer病の研究が一層発展することを期待する。

III アミロイド研究の今後の展望

以上神経系を障害するアミロイドーシスについてFAPとAlzheimer病を中心に述べた。アミロイドー

シスはVirchowが類澱粉症と命名して以来長年疾患概念の誤解があったが、現在は蛋白代謝の異常症として捉えられている。一方発生機序の面からは、FAPを含む全身性アミロイドーシスではアミロイド前駆蛋白が流血中に必ず存在し、またAlzheimer病のような局所性アミロイドーシスではアミロイド沈着を生じる組織の構成細胞がアミロイド前駆蛋白を産生していることが定説となった。今日アミロイドーシスの研究は遺伝子解析、微量蛋白の分析法などを駆使してアミロイド産生機序を分子レベルから追求している。しかし未だ多くの本疾患においてアミロイド産生細胞を同定することができないのが現状である。十数年以上の歳月を経て発症してくるアミロイドーシスにおいては、加齢を含むその間の個体側の変化も重要な要因となるであろう。今後本症の成因解明に対して多方面から一層の研究が必要であることを強調して稿を終える。

謝 辞

本稿の懇切な御校閲を賜った恩師柳澤信夫教授に深謝いたします。

文 献

- 1) Glenn GG: Amyloid deposits and amyloidosis. The β -fibrilloses (second of two parts). *N Engl J Med* 302: 1333-1343, 1980
- 2) Andrade C: A peculiar form of peripheral neuropathy: familial atypical generalized amyloidosis with special involvement of the peripheral nerves. *Brain* 75: 408-427, 1952
- 3) Araki S, Mawatari S, Ohta M, Nakajima A, Kuroiwa Y: Polyneuritic amyloidosis in a Japanese family. *Arch Neurol* 18: 593-602, 1968
- 4) Kito S, Itoga E, Kamiya K, Kishida T, Yamamura Y: Studies on familial amyloid polyneuropathy in Ogawa Village, Japan. *Eur Neurol* 19: 141-151, 1980
- 5) Andersson R: Familial amyloidosis with polyneuropathy: a clinical study based on patients living in Northern Sweden. *Acta Med Scand [Suppl]* 590: 1-64, 1976
- 6) Ikeda S, Hanyu N, Hongo M, Yoshioka J, Oguchi H, Yanagisawa N, Kobayashi T, Tsukagoshi H, Ito N, Yokota T: Hereditary generalized amyloidosis with polyneuropathy. *Brain* 110: 315-337, 1987
- 7) Hanyu N, Ikeda S, Nakadai A, Yanagisawa N, Powell HC: Peripheral nerve pathological findings in familial amyloid polyneuropathy: a correlative study of proximal sciatic nerve and sural nerve lesions. *Ann Neurol* 25: 340-350, 1989
- 8) Ikeda S, Yanagisawa N, Hongo M, Ito N: Vagus nerve and celiac ganglion lesions in generalized amyloidosis. A correlative study of familial amyloid polyneuropathy and AL-amyloidosis. *J Neurol Sci* 79: 129-139, 1987
- 9) 矢沢正信, 池田修一, 柳澤信夫: I型家族性アミロイドポリニューロパチーの下部消化管における自律神経節病変: 組織化学および免疫組織化学的検討. *自律神経* 28: 506-512, 1991
- 10) Ikeda S, Oguchi K, Kobayashi S, Tsukahara S, Yanagisawa N: Histochemical study of rectal aminergic

- nerves in type I familial amyloid polyneuropathy. *Neurology* 33: 1055-1058, 1983
- 11) 矢沢正信: I型家族性アミロイドポリニューロパチーの下部消化管自律神経病変: 組織化学, 免疫組織化学ならびに電子顕微鏡学的研究. *信州医誌* 40: 445-462, 1992
 - 12) Tawara S, Nalazato M, Kangawa K, Matsuo H, Araki S: Identification of amyloid prealbumin variant in familial amyloidotic polyneuropathy (Japanese type). *Biochem Biophys Res Commun* 116: 880-888, 1983
 - 13) Nakazato M, Kangawa K, Minamino N, Tawara S, Matsuo H, Araki S: Identification of a prealbumin variant in the serum of a Japanese patient with familial amyloidotic polyneuropathy. *Biochem Biophys Res Commun* 122: 712-718, 1984
 - 14) Nakazato M, Kangawa K, Minamino N, Tawara S, Matsuo H, Araki S: Radioimmunoassay for detecting abnormal prealbumin in the serum for diagnosis of familial amyloidotic polyneuropathy (Japanese type). *Biochem Biophys Res Commun* 122: 719-725, 1984
 - 15) Sasaki H, Sakaki Y, Matsuo H, Goto I, Kuroiwa Y, Sahashi I, Takahashi A, Shinoda T, Isobe T, Takagi Y: Diagnosis of familial amyloidotic polyneuropathy by recombinant DNA technique. *Biochem Biophys Res Commun* 125: 636-642, 1984
 - 16) Mita S, Maeda S, Shimada K, Araki S: Cloning and sequence analysis of cDNA for human prealbumin. *Biochem Biophys Res Commun* 124: 558-564, 1984
 - 17) Tsuzuki T, Mita S, Maeda S, Araki S, Shimada K: Structure of the human prealbumin gene. *J Biol Chem* 260: 12224-12227, 1985
 - 18) Wallace MR, Naylor S, Kluge-Beckerman B, Long GL, McDonald L, Showa TB, Benson MD: Localization of the human prealbumin gene to chromosome 18. *Biochem Biophys Res Commun* 129: 753-758, 1985
 - 19) Mita S, Maeda S, Ide M, Tsuzuki T, Shimada K, Araki S: Familial amyloidotic polyneuropathy diagnosed by cloned human prealbumin cDNA. *Neurology* 36: 298-301, 1986
 - 20) 池田修一, 中野 武, 柳沢信夫, 鈴木友和, 羽生憲直, 榎 佳之: 遺伝子解析, 血漿アミロイド前駆蛋白ならびに組織アミロイド蛋白の同定法による家族性アミロイドポリニューロパチーの総合的診断法. *臨床神経学* 31: 363-371, 1991
 - 21) Sakaki Y, Sasaki H, Yoshioka K, Furuya H: Genetic analysis of familial amyloidotic polyneuropathy, an autosomal dominant disease. *Clin Chim Acta* 185: 291-298, 1989
 - 22) Nakazato M, Kurihara T, Matukura S, Kangawa K, Matsuo H: Diagnostic radioimmunoassay for familial amyloidotic polyneuropathy before clinical onset. *J Clin Invest* 77: 1699-1703, 1986
 - 23) Wakasugi S, Inomoto T, Yi S, Naito M, Uehira M, Iwanaga T, Maeda S, Araki K, Miyazaki J, Takahashi K, Shimada K, Yamamura K: A transgenic mouse model of familial amyloidotic polyneuropathy. *Proc Japan Acad* 63 Ser B: 344-347, 1987
 - 24) Yi S, Takahashi K, Naito M, Tashiro F, Wakasugi S, Maeda S, Shimada K, Yamamura K, Araki S: Systemic amyloidosis in transgenic mice carrying the human mutant transthyretin (Met 30) gene. *Am J Pathol* 138: 403-412, 1991
 - 25) Nicholas WC, Dwulet FE, Liepnieks J, Benson MD: Variant apolipoprotein AI as a major constituent of a human hereditary amyloid. *Biochem Biophys Res Commun* 156: 762-768, 1988
 - 26) Maury CPJ: Gelsolin-related amyloidosis. Identification of the amyloid protein in Finnish hereditary amyloidosis as a fragment of variant gelsolin. *J Clin Invest* 87: 1195-1199, 1991
 - 27) Kanda Y, Goodman De WS, Canfield RE, Morgan FJ: The amino acid sequence of human plasma prealbumin. *J Biol Chem* 249: 6796-6805, 1974
 - 28) Richardson JS: The anatomy and taxonomy of protein structure. *Adv Protein Chem* 34: 167-339, 1981
 - 29) Nakazato M, Ikeda S, Shimoi K, Matsukura S, Yoshida K, Shimizu H, Atumi T, Kangawa K, Matsuo

- H: Identification of a novel transthyretin variant (Val³⁰→Leu) associated with familial amyloidotic polyneuropathy. *FEBS Lett* 306 : 206-208, 1992
- 30) Saraiva MJM, Costa PP, Goodman DWS : Genetic expression of a transthyretin mutation in typical and late-onset Portuguese families with familial amyloidotic polyneuropathy. *Neurology* 36 : 1413-1417, 1986
 - 31) Yoshinaga T, Nakazato M, Ikeda S, Ohnishi A : Homozygosity for the transthyretin-Met30 gene in three Japanese siblings with type I familial amyloidotic polyneuropathy. *Neurology* 42 : 2045-2047, 1992
 - 32) Ikeda S, Nakano T, Yanagisawa N, Nakazato M, Tsukagoshi H : Asymptomatic homozygous gene carrier in a family with type I familial amyloid polyneuropathy. *Eur Neurol* 32 : 308-313, 1992
 - 33) Holmgren G, Bergstrom S, Dugge U, Lundgren E, Nording-Sikstrom C, Sandgren O, Steen L : Homozygosity for the transthyretin-Met30-gene in seven individuals with familial amyloidosis with polyneuropathy detected by restriction enzyme analysis of amplified genomic DNA sequences. *Clin Genet* 41 : 39-41, 1992
 - 34) 吉川隆子, 池田修一, 柳澤信夫, 矢沢正信, 羽生憲直 : 家族性アミロイドポリニューロパチーの自律神経障害に対するL-DOPS療法への検討. *自律神経* 24 : 113-121, 1987
 - 35) Holmgren G, Steen L, Eksted J, Groth C-G, Ericzon B-G, Eridsson S, Andersen O, Karlberg I, Nordén G, Nakazato M, Hawkins P, Richardson S, Pepys M : Biochemical effect of liver transplantation in two Swedish patients with familial amyloidotic polyneuropathy (FAP-met³⁰). *Clin Genet* 40 : 242-246, 1991
 - 36) Holmgren G, Ericzon B-G, Steen L, Suhr O, Andersson O, Wallin BG, Seymour A, Richardson S, Hawkins PN, Pepys MB : Clinical improvement and amyloid regression after liver transplantation in hereditary transthyretin amyloidosis. *Lancet* 341 : 1113-1116, 1993
 - 37) Gudmundsson G, Hallgrimsson J, Jonasson TA, Bjarnason O : Hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis. *Brain* 95 : 387-404, 1972
 - 38) Castaño EM, Frangione B : Human amyloidosis, Alzheimer's disease and related disorders. *Lab Invest* 58 : 122-132, 1988
 - 39) Kidd M : Alzheimer's disease. An electron microscopical study. *Brain* 87 : 307-320, 1964
 - 40) Glenner GG, Henry JH, Fujihara S : Congoophilic angiopathy in the pathogenesis of Alzheimer's degeneration. *Ann Pathol* 1 : 120-129, 1981
 - 41) Glenner GG, Wong CW : Alzheimer's disease : initial report of purification and characterization of a novel cerebrovascular amyloid protein. *Biochem Biophys Res Commun* 120 : 885-890, 1984
 - 42) Masters CL, Simms G, Weinman NA, Multhaup G, McDonald BL, Beyreuther K : Amyloid plaque core protein in Alzheimer disease and Down syndrome. *Proc Natl Acad Sci U S A* 82 : 4245-4249, 1985
 - 43) Wong CW, Quaranta V, Glenner GG : Neuritic plaques and cerebrovascular amyloid in Alzheimer disease are antigenically related. *Proc Natl Acad Sci U S A* 82 : 8729-8732, 1985
 - 44) Ikeda S, Wong CW, Allsop D, Landon M, Kidd M, Grenner GG : Immunogold labeling of cerebrovascular and neuritic plaque amyloid fibrils in Alzheimer's disease with an anti- β protein monoclonal antibody. *Lab Invest* 57 : 446-449, 1987
 - 45) Wisniewski HM, Terry RD : Reexamination of the pathogenesis of the senile plaques. In : Zimmerman HM (ed), *Progress in neuropathology*, vol II, pp 1-26, Grune and Stratton, New York, 1973
 - 46) Yamaguchi H, Hirai S, Morimatsu M, Shoji M, Ihara Y : A variety of cerebral amyloid deposits in the brains of the Alzheimer-type dementia demonstrated by β -protein immunostaining. *Acta Neuropathol (Berl)* 76 : 541-549, 1988
 - 47) Tagliavini F, Giaccone G, Frangione B, Bugiani O : Preamyloid deposits in the cerebral cortex of patients with Alzheimer's disease and nondemented individuals. *Neurosci Lett* 93 : 191-196, 1988
 - 48) Ikeda S, Allsop D, Glenner GG : Morphology and distribution of plaque and related deposits in the brains

- of Alzheimer's disease and control cases. An immunohistochemical study using amyloid β -protein antibody. *Lab Invest* 60 : 113-122, 1989a
- 49) Kang J, Lemaire H-G, Unterbeck A, Salbaum JM, Masters CL, Grzeschik K-H, Multhaup G, Beyreuther K, Muller Hill B : The precursor of Alzheimer's disease amyloid A4 protein resembles a cell-surface receptor. *Nature* 325 : 733-736, 1987
 - 50) Buger PC, Vogel FS : The development of the pathologic changes of Alzheimer's disease and senile dementia in patients with Down's syndrome. *Am J Pathol* 73 : 457-476, 1973
 - 51) Ikeda S, Yanagisawa N, Allsop D, Glenner GG : Evidence of amyloid β -protein immunoreactive early plaque lesions in Down's syndrome brains. *Lab Invest* 61 : 133-137, 1989b
 - 52) Nukina N, Ihara Y : One of the antigenic determinants of paired helical filaments is related to tau protein. *J Biochem (Tokyo)* 99 : 1541-1544, 1986
 - 53) Grundke-Iqbal I, Iqbal K, Quinlan M, Tung Y-C, Zaidi MS, Wisniewski HM : Microtubule-associated protein tau. A component of Alzheimer paired helical filaments. *J Biol Chem* 261 : 6084-6089, 1986
 - 54) Tabaton M, Mandybur TI, Perry G, Onorato M, Autilio-Gambetti L, Gambetti P : The widespread alternation of neurites in Alzheimer's disease may be unrelated to amyloid deposition. *Ann Neurol* 26 : 771-778, 1989
 - 55) Ponte P, Gonzalez-Dewhitt P, Schilling J, Miller J, Hsu D, Greenberg B, Davis K, Wallace W, Lieberburg I, Fuller F, Cordell B : A new A4 amyloid mRNA contains a domain homologous to serine proteinase inhibitors. *Nature* 331 : 525-527, 1988
 - 56) Tanji RE, McClatchey AI, Lamperti ED, Villa-Komaroff L, Gusella JF, Neve RL : Protease inhibitor domain encoded by an amyloid protein precursor mRNA associated with Alzheimer's disease. *Nature* 331 : 528-530, 1988
 - 57) Kitaguchi N, Takahashi Y, Tokushima Y, Shiojiri S, Ito H : Novel precursor of Alzheimer's disease amyloid protein shows protease inhibitory activity. *Nature* 331 : 530-532, 1988
 - 58) Tanaka S, Shiojiri S, Takahashi Y, Kitaguchi N, Ito H, Kameyama M, Kimura J, Nakamura S, Ueda K : Tissue-specific expression of three types of β -protein precursor mRNA : Enhancement of protease inhibitor-harboring types in Alzheimer's disease brain. *Biochem Biophys Res Commun* 165 : 1406-1414, 1989
 - 59) Bush AI, Martins RN, Rumble B, Mori R, Fuller S, Milward E, Currie J, Ames D, Weidemann A, Fischer P, Multhaup G, Beyreuther K, Masters CL : The amyloid precursor protein of Alzheimer's disease is released by human platelets. *J Biol Chem* 265 : 15977-15983, 1990
 - 60) Van Nostrand WE, Schmaier AH, Farrow JS, Cunningham DD : Protease Nexin-II (amyloid β -protein precursor) : A platelet α -granule protein. *Science* 248 : 745-748, 1990
 - 61) Smith RP, Higuchi DA, Broze GJ : Platelet coagulation factor XIa-inhibitor, a form of Alzheimer amyloid precursor protein. *Science* 248 : 1126-1128, 1990
 - 62) Weidemann A, König G, Bunke D, Fischer P, Salbaum JM, Masters CL, Beyreuther K : Identification, biogenesis, and localization of precursors of Alzheimer's disease A4 amyloid protein. *Cell* 57 : 115-126, 1989
 - 63) Bush AI, Whyte S, Thomas LD, Williamson TG, Van Tiggelen CJ, Currie J, Small DH, Moir RD, Li O-X, Rumble B, Mönning U, Beyreuther K, Masters CL : An abnormality of plasma amyloid protein precursor in Alzheimer's disease. *Ann Neurol* 32 : 57-65, 1992
 - 64) Kennedy H, Kametani F, Allsop D : Only Kunitz-inhibitor-containing isoforms of secreted Alzheimer amyloid precursor protein show amyloid immunoreactivity in normal cerebrospinal fluid. *Neurodegeneration* 1 : 59-64, 1992

- 65) Andersson JP, Esch FA, Keim PS, Sambamurti K, Lieberburg I, Robakis NK : Exact cleavage site of Alzheimer amyloid precursor in neuronal PC-12 cells. *Neurosci Lett* 128 : 126-128, 1991
- 66) Estus S, Golde TE, Kunishita T, Blades D, Lowery D, Eisen M, Usiak M, Qu X, Tabira T, Greenberg BD, Younkin SG : Potentially amyloidogenic, carboxyl-terminal derivatives of the amyloid protein precursor. *Science* 255 : 726-728, 1992
- 67) Golde TE, Estus S, Younkin LH, Selkoe DJ, Younkin SG : Processing of the amyloid precursor to potentially amyloidogenic derivatives. *Science* 255 : 728-730, 1992
- 68) Haas C, Koo EH, Mellon A, Hung AY, Selkoe DJ : Targeting of cell-surface β -amyloid precursor protein to lysosomes : alternative processing into amyloid-bearing fragments. *Nature* 357 : 500-503, 1992
- 69) Giuffra L, Haynes A, Irving N, James L, Mant R, Newton P, Rooke K, Roques P, Talbot C, Pericak-Vance M, Rosens A, Williamson R, Rosser M, Owen M, Hardy J : Segregation of a missense mutation in the amyloid precursor protein gene with familial Alzheimer's disease. *Nature* 349 : 704-706, 1991
- 70) Hardy J : Framing β -amyloid. *Nature Genet* 1 : 233-234, 1992
- 71) Cai X-D, Golde TE, Younkin SG : Release of excess amyloid β protein from a mutant amyloid β protein precursor. *Science* 259 : 514-516, 1993
- 72) Glenner GG, Wong CW, Quaranta V, Eanes ED : The amyloid deposits in Alzheimer's disease. Their nature and pathogenesis. *Appl Pathol* 2 : 357-369, 1984
- 73) Masters CL, Multhaup G, Simms G, Pottgiesser J, Martins RN, Beyreuther K : Neuronal origin of a cerebral amyloid : neurofibrillary tangles of Alzheimer's disease contain the same protein as the amyloid of plaque cores and blood vessels. *EMBO J* 4 : 2757-2763, 1985
- 74) Allsop D, Haga S, Haga C, Ikeda S, Mann DMA, Ishii T : Early senile plaques in Down's syndrome brains show a close relationship with cell bodies of neurons. *Neuropathol. Appl Neurobiol* 15 : 531-542, 1989
- 75) Probst A, Langui D, Ipsen S, Robakis N, Ulrich J : Deposition of β /A4 protein along neuronal plasma membranes in diffuse senile plaques. *Acta Neuropathol (Berl)* 83 : 21-29, 1991
- 76) Yankner BA, Dawes LR, Fisher S, Villa-Komaroff L, Oster-Granite ML, Nove RL : Neurotoxicity of a fragment of the amyloid precursor associated with Alzheimer's disease. *Science* 245 : 417-420, 1989

(5. 4. 8 受稿)